

Progesterona inyectable



La progesterona es una hormona que produce el organismo de las mujeres, que aumenta durante el embarazo. Los tratamientos con progesterona permiten reducir la probabilidad de parto prematuro en mujeres que no producen la cantidad suficiente de la hormona. Si ha tenido un parto prematuro después de 16 semanas o antes de 37 semanas de embarazo, puede que le administren este medicamento.

P ¿Cómo se administra este medicamento?

R Este medicamento se administra a través de una inyección en el músculo de la nalga, una vez a la semana, en la consulta del médico o matrón o por un enfermero de atención de salud en el hogar. Pueden comenzar a administrarle el medicamento entre las semanas 16 y 24 del embarazo y seguir con el medicamento hasta la semana 37 del embarazo.

P ¿Con qué frecuencia se administran las inyecciones?

R Se deben administrar las inyecciones con un mínimo de 5 días de diferencia y un máximo de 9 días.

P ¿Hay efectos secundarios?

R La progesterona no tiene efectos dañinos en el bebé. Para la madre, los efectos secundarios son poco comunes, pero podrían ser:

- Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón o moretones en el lugar de la inyección.
- Dolores de cabeza.
- Náuseas o vómitos.
- Diarrea.

Si estos efectos secundarios empeoran, comuníquese con el médico, matrón o enfermero de inmediato.

P ¿Que debería hacer si se me olvida una dosis?

R Es importante que no olvide ninguna dosis de este medicamento.

- Si lo hace, se puede administrar la dosis olvidada de forma segura dentro de 2 o 3 días desde el día que debía administrarse la dosis.
- Si transcurrieron más de 3 días, comuníquese con el médico, matrón o enfermero de inmediato.
- No administre dos dosis a la vez.

P ¿Cómo debo almacenar el medicamento?

R Si se coloca las inyecciones en el hogar, almacene este medicamento a temperatura ambiente. Manténgalo lejos del calor, la humedad y la luz directa. Almacene todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

P ¿Cuándo necesita hablar con el médico, matrón o enfermero?

R Hable con el médico, matrón o enfermero si los efectos secundarios indicados anteriormente empeoran mientras toma el medicamento y antes de empezar a tomar algún otro medicamento, como medicamentos de venta sin receta médica, vitaminas o productos de origen vegetal.

P ¿Cuáles son las señales de advertencia de un parto prematuro?

R Las señales de parto prematuro no son las mismas para todas las mujeres. Un parto prematuro puede comenzar de forma imprevista y sin advertencia, y se desconoce la causa. Llame al médico, matrón o enfermero de inmediato si presenta alguna de las siguientes señales:

- Contracciones, con o sin dolor, 4 a 6 veces por hora.
- Dolor sordo en la parte baja de la espalda.
- Presión entre las piernas o en la parte baja del abdomen.
- Diarrea.
- Manchado o sangrado vaginal.
- Flujo o sangrado vaginal.
- Secreción vaginal acuosa, clara, rosada o roja.
- Calambres en la parte baja del abdomen o espalda, como si fuera a comenzar su período menstrual.
- Dolor intenso, contracciones o tensión en el abdomen.
- Sensación de que el bebé "se enrolla".
- Sensación de que algo no está bien.



Partos con Mejores Resultados de Ohio (OBBO, Ohio Better Birth Outcomes) es socio de CelebrateOne, una iniciativa para toda la comunidad para reducir la mortalidad infantil y permitir que más bebés celebren sus primeros cumpleaños. Para obtener más información y recursos, visite www.celebrateone.info y www.ohiobetterbirthoutcomes.org.

Información cortesía de Ohio State University Wexner Medical Center.